

EXTRA FOAL

Leche maternizada para potros

POTROS



Extra Foal es una leche de elevada calidad, formulada según los conceptos dietéticos más recientes. Moderado contenido de lactosa y proteínas para controlar la enteritis bacteriana. Elevado aporte de aminoácidos esenciales para un correcto crecimiento. Factores emulsionantes para facilitar la digestión de grasas. Sales rehidratantes para mejorar la hidratación del potro.

COMPOSICIÓN:

Leche desnatada en polvo, suero de leche en polvo, glucosa deshidratada, dextrosa, aceite de palma, harina de trigo, aceite de coco y aromas.

Componentes analíticos:

Proteína bruta: 15,5%; Fibra bruta: 0,3%; Aceites y grasas brutas: 9,3%; Cenizas: 7%; Sodio: 0,4%.

Aditivos por kg:

Vitamina A (E672)	20.000 UI	Pantotenato cálcico	10,5mg
Vitamina D3 (E671)	2,000 UI	Ácido fólico	0,5mg
Vitamina E	150mg	Vitamina C	50mg
Vitamina K	5mg	Colina	150mg
Vitamina B1	5mg	Lisina	15gr
Vitamina B3	3mg	Metionina	4,3gr
Vitamina B6	1,5mg	Cistina	1,7gr
Vitamina B12	75ug		

ADVERTENCIAS:

Asegurar el acceso fácil y permanente a agua limpia.

Eliminar la leche reconstituida sobrante después de cada toma.

Lavar bien los recipientes en el proceso.

No administrar simultáneamente vitamina D2.

PRESENTACIÓN:

Cubo de 5 kg



INSTRUCCIONES DE USO:

Administrar tras la toma de calostro, desde el primer día de vida. Mezclar 1 parte de Extra Foal por cada 9 partes de agua a 60°C y administrar a una temperatura de 40°C. El primer día la cantidad puede variar en función de la cantidad de calostro tomada.

Potros peso al nacer > 50 kg

EDAD POTRO	NÚMERO TOMAS DIARIAS
0-3 días	24
4º día	16
5º día	16
6º día	16
7º día	16
2ª semana	12
3ª semana	8
4-5ª semana	6
6-8ª semana	6
9-12ª semana	6
13-14ª semana	6

Potros con un peso al nacer < 50 kg

EDAD POTRO	NÚMERO TOMAS DIARIAS
0-7 días	24
2ª semana	24
3ª semana	16
4-5ª semana	12
6-8ª semana	12
9-12ª semana	12
13-14ª semana	12

Para necesidades superiores se puede incrementar la cantidad de leche y la frecuencia de tomas diarias. En caso de potros débiles y/o patologías puede ser necesario el soporte nutricional vía parenteral.