

Equioxx

57mg Firocoxib

FIROCOXIB 57 MG COMPRIMIDOS MASTICABLES PARA CABALLOS



El único AINE para caballos en formato comprimido



Larga duración de acción: el efecto de 1 comprimido dura 24 horas



Misma eficacia que con fenilbutazona¹



Único AINE inhibidor selectivo para COX-2



■ **Modo de acción:** El firocoxib es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE)

perteneciente al grupo de los Coxib, que actúa por inhibición selectiva de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), mediadora de la síntesis de prostaglandinas. COX-2 es el isomorfo de la enzima que ha mostrado estar inducido por estímulos proinflamatorios y del que se ha postulado que era el principal responsable de la síntesis de prostanoïdes mediadores del dolor, de la inflamación y de la fiebre. En ensayos in vitro efectuados en sangre equina completa, el firocoxib se muestra aproximadamente de 222 a 643 veces más selectivo para COX-2 que para COX-1.

■ **Indicaciones:** alivio del dolor e inflamación asociados con la osteoartritis y reducción de la cojera asociada en caballos.

■ **Posología:** Vía oral. Administrar un comprimido una vez al día en caballos que pesen 450-600 kg. La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada, pero no debería exceder de 14 días.

■ **Instrucciones para una correcta administración:** El comprimido debería administrarse con una pequeña cantidad de comida en una cubeta o directamente de la mano, presentando el comprimido mezclado con una pequeña cantidad de comida o premio en la palma de la mano. Después de la administración, se recomienda examinar la cavidad bucal para asegurarse de que el comprimido ha sido tragado correctamente.

■ **Contraindicaciones:** no usar en animales que padezcan trastornos gastrointestinales o hemorrágicos, o tengan la función hepática, cardíaca o renal dañadas o discrasias sanguíneas. No usar en animales de cría, gestantes o lactantes. No usar simultáneamente con corticoesteroides ni con otros antiinflamatorios no esteroideos (AINES). No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

■ **Reacciones adversas:** Ocasionalmente pueden observarse en los animales tratados lesiones (erosión/ulceración) de la mucosa oral y de la piel alrededor de la boca. Normalmente, estas lesiones son leves y se resuelven sin tratamiento, pero las lesiones orales pueden estar asociadas con salivación y edema labial y de lengua. La frecuencia de las reacciones adversas se debe clasificar conforme a los siguientes grupos: muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 presenta reacciones adversas durante un tratamiento), frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100), infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1.000), en raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000), en muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10.000, incluyendo casos aislados).

■ **Retraso por dopaje:** 14 días.

■ **Tiempo de espera:** carne: 26 días. Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

■ **Formato:** 1 caja de cartón que contiene 1 blíster con 10 comprimidos.

■ **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

Composición

Firocoxib 57 mg

1. DOUCET M.Y., et al., Comparison of efficacy and safety of firocoxib and phenylbutazone in horses with naturally occurring osteoarthritis. JAVMA, Vol 232, 1, January 2008.